

# COMO ADMINISTRAR OS BRONCODILATADORES?



## INALADORES PRESSURIZADOS DOSEÁVEIS (PMDIS)



RETIRAR A TAMPA

AGITAR O INALADOR ("BOMBA")



ADAPTAR INALADOR À CÂMARA EXPANSORA- SE NECESSÁRIA

ADAPTAR O BOCAL OU MÁSCARA

EXPIRAR PROFUNDAMENTE



REALIZAR A INALAÇÃO

"SUSTER" A RESPIRAÇÃO DURANTE 10 SEGUNDOS.

REPETIR A INALAÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA

HIGIENIZAR E SECAR BEM O BOCAL

BOCHECHAR ÁGUA.

## INALADORES DE PÓ SECO (DPIS):

ABRA O DISPOSITIVO E INSIRA A CÁPSULA DE PÓ SECO (SE APLICÁVEL)

**OU**

RODE A PEÇA GIRATÓRIA DISPENSADORA DE DOSE



ADAPTAR O BOCAL

FAÇA UMA INALAÇÃO RÁPIDA E PROFUNDA. PARA LIBERTAR O PÓ DO DISPOSITIVO

"SUSTER" A RESPIRAÇÃO DURANTE 10 SEGUNDOS.

REPETIR A INALAÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA

HIGIENIZAR E SECAR BEM O BOCAL

BOCHECHAR ÁGUA.

(Aguiar, et al., 2016))


**CONTACTOS EM CASO DE DÚVIDA:**

info@careceiver

# INALOTERAPIA



## SISTEMA RESPIRATÓRIO



O sistema respiratório permite eliminar o dióxido de carbono do sangue circulante e absorver oxigênio inspirado.

(Weibel, 2017; Janowiak, 2022)

## SINAIS DE DIFICULDADE RESPIRATÓRIA

Reconhecer precocemente os sinais de dificuldades respiratórias pode fazer a diferença na prevenção e tratamento atempados.



(Alwarith et al., 2020; Akashiba, et al., 2020; MacLeod, et al., 2021)

## TERAPÊUTICA INALATÓRIA (BRONCODILADORES)

A terapêutica inalatória tem como principal objetivo a entrega da dose terapêutica do medicamento, que é libertada sob a forma de aerossol, nas vias respiratórias inferiores.

Esta abordagem é recomendada no tratamento de condições respiratórias, tais como:

- Asma;
- Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC);
- Fibrose cística;
- Bronquiectasias.

(Alwarith et al., 2020; Akashiba, et al., 2020; MacLeod, et al., 2021)

## TIPOS DE DISPOSITIVOS INALATÓRIOS OU “BOMBAS”

Existem diferentes tipos de dispositivos inalatórios, cada um com suas características:


### INALADORES PRESSURIZADOS DOSEÁVEIS (PMDIS):

- Podem ser usados com ou sem câmara expansora;
- Eficientes na entrega do medicamento nas vias respiratórias inferiores.



### INALADORES DE PÓ SECO (DPIS):

- Libertam o medicamento de forma diferente dos pMDIs;
- Requerem uma capacidade de inspiração rápida para propagação da absorção.



### INALADORES COM SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO:

- Transformam uma solução em aerossol.
- Utilizados conforme a prescrição médica durante determinado período do tempo.



A seleção do dispositivo inalatório correto é essencial para o tratamento eficaz. Consulte o seu médico para determinar qual dispositivo atende às suas necessidades específicas.

**Lembre-se, a técnica adequada de inalação desempenha um papel fundamental no sucesso do tratamento. Certifique-se de seguir as instruções do profissional de saúde.**

(Fontes, 2015)